

NECESIDADES DEL PACIENTE

PSICOLÓGICAS - EMOCIONALES

- La demencia es un síndrome de naturaleza crónica progresiva, caracterizado por deterioro de funciones cognitivas y de la conducta, que ocasiona discapacidad y dependencia. Se estima que 8% de la población adulta mayor en México cursa con demencia (aproximadamente 800,00) y un número similar con deterioro cognoscitivo no demencial. Los padecimientos mentales son potencialmente incapacitantes y generadores de alto costo socioeconómico y mala calidad de vida en quien los sufre sus familias.
- La experiencia de permanecer dentro de un hospital puede resultar desalentadora para los pacientes. Es importante lograr niveles confortables y cómodos, capaces de fomentar la salud, eliminando posibles riesgos.
- Los espacios construidos deben:
 - Fomentar bienestar físico
 - Moral
 - Social

MÉDICAS

- El adulto mayor además de enfrentar el riesgo de padecer obesidad y sobrepeso, puede sufrir mala nutrición por deficiencia de calorías de proteínas o de micronutrientes. La sarcopenia definida como la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento es un problema de salud y nutrición en los adultos mayores mexicanos.
- En los casos más severos, COVID19 puede producir neumonía, que puede complicarse con un síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) y shock distributivo, cardiogénico o mixto
- Consideraciones sobre el trato del paciente geriátrico durante su estancia en el hospital.
- Trato digno : El paciente se encuentra en estado de salud crítico, no tiene familiares para apoyo moral, y tendrá muchas necesidades físicas y mentales, por lo que por parte del personal de salud, debe recibir un trato digno irrestricto a la persona y a su integridad.
- Consentimiento sobre procedimientos: El paciente probablemente se encuentre en un estado de delirium o de demencia, por el hecho de que pasará muchos días sin ver el reloj y viendo las mismas luces, por lo que se pueden desencadenar síntomas de amnesia. El personal de salud debe informar a detalle cada procedimiento e intervención que el paciente tenga, igualmente recibir su consentimiento (en caso de estar lúcido).